




ควรรู้...การฉีด 

สารโบทูลินัมทอกซินเพื่อความงาม



สารโบทูลินัมทอกซิน (Botulinum Toxin: Botox)

สร้างจากแบคทีเรียคลอสทริเดียม โบทูลินัม

ยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อ

สาเหตุของการเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่น

ออกฤทธิ์ได้เพียงชั่วคราว
ประมาณ 3-4 เดือนเท่านั้น

สารโบทูลินัมทอกซินไม่สามารถแก้ไขริ้วรอยที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ได้

ข้อควรปฏิบัติหลังฉีดสารโบทูลินัมทอกซิน

1. **ไม่ควรนอราบ**
หลังฉีด 3-4 ชั่วโมง
2. กรณีมีอาการบวมแดงหรือช้ำ
สามารถประคบน้ำแข็งได้
ในช่วง 1 - 2 วันแรก หลังฉีด
3. **ห้ามนวดบริเวณที่ฉีด**
4. **พยายามขยับกล้ามเนื้อ**
บริเวณที่ฉีด 1 - 2 ชั่วโมงหลังฉีด
เพื่อให้ยากระจายเข้ากล้ามเนื้อได้มาก
5. **พบแพทย์ตามนัด**



ใครไม่ควรฉีด



สตรีตั้งครรภ์
/ให้นมบุตร



ผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางกล้ามเนื้อ



ผู้ที่มีความผิดปกติ
ของระบบประสาท

ควรแจ้งแพทย์เกี่ยวกับโรคประจำตัว ประวัติทางการแพทย์ **ก่อนตัดสินใจฉีด**