เมื่อมีอาการปวด

ต้องกินยาแก้ปวด ให้หมดแผงจริงหรือ?



ยาแก้ปวดควรใช้เมื่อไหร่ ?

ใช้เมื่อมีอาการเท่านั้น

ไม่จำเป็น ต้องใช้จนหมดแผง

ทำไมไม่ควรใช้ยาแก้ปวดจนหมดแผง ?

- ยามีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดเท่านั้น ไม่ช่วยรักษาสาเหตุของอาการปวด
- เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

โดยทั่วไปมักใช้ยาแก้ปวดชนิดไม่เสพติด
เพื่อบรรเทาอาการปวดระดับน้อย ถึงปานกลาง
ยาแก้ปวดชนิดไม่เสพติด เช่น
ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) และ ยากลุ่ม NSAIDs

สรุป เมื่อมีอาการปวดต้องกินยาแก้ปวดให้หมดแผงไม่จริง

ตัวอย่างผลข้างเคียงของยาแก้ปวด
- ยากลุ่ม NSAIDs เช่น ระคายเคือง/เกิดแผลในทางเดินอาหาร
  การทำงานของไตลดลงรบกวนการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด มีผลทำให้หลอดลมหดตัว
- ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) เช่น เวียนหัว เกิดผื่น การทำงานของตับลดลง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food and Drug Administration

/FDATHAI